

GERMAN NEW MEDICINE® (GNM)

De nieuwe medische paradigma

© Door Caroline Markolin, Ph.D., Vancouver, Canada

INTRODUCTIE

Op 18 augustus 1978 ontving de arts dr. Ryke Geerd Hamer, die op dat moment als internist werkzaam was op de afdeling oncologie van de universiteitskliniek van München, het schokkende bericht dat zijn zoon Dirk was neergeschoten. Dirk overleed in december 1978. Een paar maanden later werd bij dr. Hamer de diagnose testiscarcinoom gesteld. Omdat hij voor die tijd nooit ernstig ziek geweest was, vermoedde hij onmiddellijk dat de ontwikkeling van zijn kanker direct gerelateerd zou kunnen zijn aan het tragische verlies van zijn zoon.

De dood van Dirk en zijn eigen ervaring met kanker brachten hem ertoe om de persoonlijke geschiedenis van zijn kankerpatiënten te gaan onderzoeken. Al snel merkte hij dat zij allemaal een buitengewoon stressvolle tijd hadden doorgemaakt in de periode voordat de kanker zich ontwikkelde, net als hijzelf. Het waarnemen van een relatie tussen de geest en het lichaam was niet echt verrassend. Ontelbare studies hebben al aangetoond dat kanker en andere ziektes vaak voorafgegaan worden door een traumatische gebeurtenis. Maar dr. Hamer voerde dit onderzoek een heel belangrijke stap verder door. Hij volgde de hypothese dat alle lichaamsprocessen door de hersenen worden geregeld en aangestuurd en daarom analyseerde hij de hersenscans van zijn patiënten en vergeleek deze met hun medische gegevens. Dr. Hamer ontdekte dat elke ziekte - niet alleen kanker!- wordt gereguleerd vanuit zijn eigen specifieke gebied in de hersenen en dat de ziekte verbonden is met een heel specifieke, identificeerbare 'conflictshock'.

Dr. Hamer noemde zijn bevindingen de '**Vijf Biologische Wetten van de Nieuwe Geneeskunde**' omdat deze biologische wetten, welke zijn toe te passen op elke patiëntencasus, een totaal nieuw begrip bieden van de oorzaak, de ontwikkeling en het natuurlijke genezingsproces van ziekte.

Als antwoord op de groeiende aantallen foute interpretaties van zijn ontdekkingen en om de integriteit en authenticiteit van zijn wetenschappelijke werk te behouden, heeft dr. Hamer zijn onderzoeksmateriaal nu wettelijk beschermd onder de naam German New Medicine® (GNM). De term 'New Medicine' kon niet internationaal door het copyright beschermd worden.

In 1981 presenteerde dr. Hamer zijn bevindingen aan de medische faculteit van de universiteit van Tübingen als een postdoctoraal thesis. Tot op de dag van vandaag weigert deze universiteit om het onderzoek van dr. Hamer te testen, ondanks hun wettelijke verplichting daartoe. Dit is een situatie die in de geschiedenis van de universiteiten nog nooit eerder is voorgekomen. Op dezelfde manier weigert de officiële geneeskunde om zijn ontdekkingen te erkennen, ondanks ongeveer 30 wetenschappelijke verificaties die zowel door onafhankelijke artsen als door professionele genootschappen zijn uitgevoerd.

Korte tijd nadat dr. Hamer zijn thesis had ingediend, werd hem een ultimatum gesteld. Hij zou zijn ontdekkingen moeten verloochenen of anders zou zijn contract bij de universiteitskliniek niet meer verlengd worden. In 1986 werd dr. Hamer zijn recht om de geneeskunde uit te oefenen ontnomen, ook al was zijn wetenschappelijke werk nog nooit in twijfel getrokken, laat staan weerlegd. De reden die werd opgevoerd was dat hij weigerde zich te conformeren aan de principes van de standaard geneeskunde. Toch was hij vastbesloten om zijn werk voort te zetten. In 1987 kon hij zijn ontdekkingen uitbreiden tot bijna elke ziekte die in de geneeskunde bekend is.

Dr. Hamer wordt al meer dan 25 jaar vervolgd en aangevallen, met name door de Duitse en Franse autoriteiten. Sinds 1997 woont dr. Hamer - in ballingschap - in Spanje, waar hij zijn research voortzet en waar hij door blijft vechten voor de officiële erkenning van zijn 'Nieuwe Geneeskunde'. Maar zolang als de medische faculteit van de universiteit van Tübingen zijn vertragingstactiek blijft volhouden, worden patiënten over de hele wereld het profijt van de revolutionaire ontdekkingen van dr. Hamer ontzegd.

DE HERSENEN ALS DE PLAATS WAAR ZIEKTES ONTSTAAN

Dr. Hamer stelde vast dat 'elke ziekte wordt veroorzaakt door een conflictshock die iemand volkomen onvoorbereid treft.' (De eerste Biologische Wet). In aandenken aan zijn zoon noemde dr. Hamer deze onverwachte stressvolle gebeurtenis het Dirk Hamer Syndroom of DHS. Uit psychologisch oogpunt is een DHS een heel persoonlijke gebeurtenis die wordt bepaald door onze ervaringen in het verleden, onze kwetsbaarheden, onze persoonlijke waarnemingen, onze waarden en onze overtuigingen. Toch is een DHS *niet alleen een psychologisch* maar eerder een *biologisch* conflict dat moet worden begrepen in de context van onze evolutie.

Dieren beleven deze biologische shocks op een letterlijke manier. Zij lijden bijvoorbeeld een conflict door een plotseling verlies van het nest of territorium, het verlies van een jong, de scheiding van een partner of van de kudde, de onverwachte dreiging te verhongeren of een doodsangst. Omdat in het verloop van de tijd de menselijke geest een figuurlijke manier van denken heeft ontwikkeld, kunnen wij deze biologische conflicten ook in overdrachtelijke zin ervaren. Een man kan bijvoorbeeld een 'territoriumverlies conflict' lijden als hij onverwachts zijn huis of zijn werkplek verliest. Een vrouwelijk 'nestconflict' kan de bezorgdheid zijn over het welzijn van een van de leden van het 'nest', een 'verlatingsconflict' kan worden getriggerd door een onverwachte scheiding of een plotselinge ziekenhuisopname. Kinderen kunnen een 'scheidingsconflict' lijden als mamma besluit weer te gaan werken of als de ouders uit elkaar gaan.




© Amiel di Dirk,
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Door het analyseren van duizenden CT-scans van de hersenen van zijn patiënten in relatie tot hun geschiedenis, ontdekte dr. Hamer dat op het moment dat het DHS plaats vindt, de shock inslaat in een specifiek en vooraf bepaald gebied in de hersenen. Dit veroorzaakt een 'laesie' die op de CT-scan te zien is als een set scherpe concentrische ringen. (In 1989 verklaarde Siemens, de grote Duitse fabrikant van CT-scanners, dat deze ringvormige formaties geen artefacten van de apparatuur zijn.)

Na de inslag van het conflict communiceren de betrokken hersengedeeltes de shock naar het bijbehorende orgaan. Deze reageert op zijn beurt met een bepaalde – voorspelbare! – verandering. De reden dat specifieke conflicten onlosmakelijk verbonden zijn met specifieke hersengebieden, is dat gedurende onze historische evolutie elk deel van de hersenen werd geprogrammeerd om onmiddellijk te reageren op conflicten die onze overleving in gevaar zouden kunnen brengen. De 'oude hersenen' (de hersenstam en kleine hersenen) zijn geprogrammeerd met basale overlevingszaken die gerelateerd zijn aan ademhaling, eten of voortplanting, terwijl de 'nieuwe hersenen' (grote hersenen) gecodeerd zijn met meer geavanceerde thema's zoals territorium conflicten, scheidingsconflicten, identiteitsconflicten en eigenwaardeconflicten.

Het medische onderzoek van dr. Hamer is sterk verbonden met de embryologie omdat de wijze waarop een orgaan reageert op een conflict, door tumorvorming of door weefselafname of door een functieverstoring, wordt bepaald door de embryologische kiemlaag waar het orgaan en het corresponderende hersenweefsel uit voortkomen. (De derde Biologische Wet)

Het ontogenetische systeem van de Zinnvolle Biologische Noodprogramma's van de natuur



Het 'Ontogenetische Systeem van Tumoren' in de GNM laat zien dat de organen die door de 'oude hersenen' worden gereguleerd - en die voortkomen uit het endoderm of het 'oude hersenen'-mesoderm, zoals longen, lever, colon, prostaat, uterus, subcutis, pleura, pericardium, peritoneum en borstklieren – altijd cellen *aanmaken* zodra het bijbehorende conflict optreedt. Tumoren in deze organen ontwikkelen zich uitsluitend gedurende de *conflictactieve* fase (die in gang is gezet door het DHS).

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar longkanker. Het biologische conflict dat gerelateerd is aan longkanker is een 'doodsangstconflict' omdat biologisch gezien de doodsangst en paniek gelijk staat aan niet kunnen ademen. Vanaf de doodsangst-shock beginnen de cellen van de longalveolen, die de ademhaling reguleren, zich onmiddellijk te vermeerderen, zij vormen een longtumor. In tegenstelling tot de conventionele opvattingen is deze vermeerdering van longcellen geen zinloos proces maar dient het een heel bepaald biologisch doel, namelijk het vergroten van de capaciteit van de longen en daarmee worden de kansen van het individu om te overleven geoptimaliseerd. Dr. Hamers analyses van de hersenscans laten zien dat iedereen met longkanker deze uitgesproken ringvormige patronen in de bijbehorende gebieden in de hersensham laten zien en dat iedere patiënt een onverwachte doodsangst of paniek heeft geleden voorafgaand aan het ontstaan van de kanker. In de meeste gevallen werd de doodsangst geleden door de shok van een kankerdiagnose die door de patiënt werd beleefd als een 'doodsvonnis'. Gezien het feit dat roken afneemt, schijnt dit een nieuw licht op de raadselachtige toename van longkanker (de 'meest dodelijke vorm van kanker!'). En je kunt je afvragen of roken wel werkelijk longkanker veroorzaakt.

Borstkanker in de melkklieren is volgens de bevindingen van dr. Hamer het gevolg van een bezorgdheidconflict over 'moeder-kind' of over een 'partner'. Dit type conflict gaat altijd naar de 'oude hersenen' in het gebied dat de melkklieren aanstuurt. Een vrouw kan een moeder-kind bezorgdheidconflict lijden als haar kind plotseling gewond raakt of ernstig ziek is. Gedurende de conflictactieve stressfase vermenigvuldigen de cellen van de melkklier zich voortdurend en vormen


zo een tumor. Het biologische doel van de celvermeerdering is om meer melk voor het noodlijdende kind te kunnen produceren en zo de genezing te versnellen. Elke vrouw en elk vrouwelijk zoogdier wordt geboren met dit eeuwenoude biologische reactie programma. De vele casestudies van dr. Hamer laten zien dat vrouwen, ook als zij geen borstvoeding geven, een tumor ontwikkelen in de melkklieren van de borst als zij zich obsessief zorgen maken over het welzijn van een geliefde, een kind dat in nood is, een partner die ziek is of een dierbare vriend die reden geeft tot bezorgdheid.

Wat over longkanker en borstkanker is gezegd, is ook van toepassing op alle andere soorten kanker die hun oorsprong hebben in de 'oude hersenen'. Elk van hen treedt door een specifieke conflictshock in werking en zet zo een 'Zinvol en Specifiek Biologisch Programma' in werking. (De vijfde Biologische Wet). Dit programma stelt het organisme in staat om het dagelijkse functioneren opzij te zetten en de lichamelijke noodsituatie het hoofd te bieden. Voor elk type conflict is er een hersengebied dat het specifieke biologische programma coördineert.

Terwijl de organen die worden aangestuurd door de 'oude hersenen' in de *conflictactieve* fase een *tumorgroei* laten zien, gebeurt het *tegenovergestelde* in alle organen die door de 'nieuwe hersenen', de grote hersenen worden aangestuurd. Met betrekking tot de embryologische kiemlagen stammen alle organen en weefsels die door de grote hersenen worden aangestuurd af van het ectoderm of van het 'nieuwe hersenen'-mesoderm. Dit zijn de ovaria, testes, botten, lymfeklieren, epidermis en het epitheel van de cervix, bronchiën, coronairvenen en melkgangen. Op het moment dat het conflict plaats vindt, zal het bijbehorende orgaanweefsel reageren met *celafname*. Dat geeft bijvoorbeeld necrose van de ovaria of testes, osteoporose, botkanker of maagzweren. Deze aandoeningen treden alleen op als iemand nog in een staat van emotionele ontredde is die gerelateerd is aan zijn conflict. Zoals we kunnen verwachten, heeft ook de afname van weefsel een biologisch nut.

Laten we als voorbeeld kijken naar het weefsel dat de melkgangetjes bekleedt. Het plaveiselepitheel van de melkgangetjes ontwikkelde zich veel later dan het weefsel van de melkklieren. Dit jongere weefsel wordt gecoördineerd vanuit een jonger deel van de hersenen, namelijk de cortex. Het biologische conflict van het plaveiselepitheel van de melkgangetjes is een 'scheidingsconflict' dat wordt ervaren alsof 'mijn kind (of partner) van mijn borst werd weggerukt'. Een vrouwelijk zoogdier lijdt een dergelijk conflict als ze haar jong of partner kwijt is geraakt of als deze gedood werd. De natuurlijke reflex op dit conflict zal het weefsel van de binnenkant van de melkgangetjes doen beginnen te ulcereren. Het doel van deze weefselafname is het vergroten van de diameter van de gangetjes, want met ruimere melkgangetjes kan de melk, die nu immers niet meer nodig is, makkelijker wegvloeien en zo ontstaat in de borst geen congestie. De hersenen van elke vrouw zijn geprogrammeerd met deze biologische reactie. Omdat de borst van de vrouw in biologisch opzicht synoniem is aan verzorging en voeding, lijden vrouwen een dergelijk conflict als ze onverwachts gescheiden zijn van een geliefde waar ze intensief voor zorgen. Er zijn bijna geen lichamelijke symptomen gedurende de conflictactieve fase, behalve misschien af en toe een licht trekkerig gevoel in de borst.

HET PATROON VAN TWEE FASES IN ELKE ZIEKTE



Dr. Hamer heeft ook ontdekt dat elke ziekte verloopt in twee fases, tenminste als het conflict wordt opgelost. (De tweede Biologische Wet). Gedurende de eerste fase, de conflictactieve fase, is het hele organisme ingesteld op het omgaan met het conflict. Terwijl op het lichamelijke niveau een zinvolle celverandering aan de gang is, proberen de psyche en het vegetatieve zenuwstelsel ook om te gaan met de onverwachte situatie. Overgeschakeld op een staat van stress (sympaticotonus) wordt het denken volledig in beslag genomen door de inhoud van het conflict. Typische symptomen van deze fase zijn slaapstoornissen en een verminderde eetlust. Vanuit de biologie bezien, is dit van vitaal belang want de focus op het conflict en de extra uren die je wakker bent, scheppen de juiste conditie om door het conflict heen te komen en een oplossing te vinden. De conflictactieve fase wordt ook wel de 'koude fase' genoemd. Omdat tijdens stress de bloedvaten vernauwd zijn, vind je tijdens de conflictactiviteit typisch koude extremiteiten, vooral koude handen, rillingen en koud zweet. Natuurlijk hangt de intensiteit van de symptomen samen met de omvang van het conflict.

Als iemand langdurig in een conflictactieve fase blijft dan kan dat fataal zijn. Maar dr. Hamer heeft zonder enige twijfel bewezen dat een organisme nooit aan kanker op zich kan sterven. Iemand kan sterven door de mechanische complicaties van een tumor, bijvoorbeeld als die een vitaal orgaan zoals het colon of de galgangen afsluit. Maar op geen enkel wijze kunnen kankercellen op zich de dood veroorzaken. In de German New Medicine is het onderscheid tussen 'maligne' en 'benigne' kanker volkomen nietszeggend en zinloos. De term 'kwaadaardig' is een kunstmatig bedenkensel (hetzelfde geldt voor tumor markers) dat gewoon aangeeft dat de actieve celdeling boven een bepaalde arbitraire waarde uit komt.

Als iemand sterft gedurende de conflictactieve fase dan is dat meestal door energieverlies, gewichtsverlies, slaapttekort en emotionele en mentale uitputting. Vaak is het de verwoestende kankerdiagnose of de negatieve prognose – 'je hebt nog zes maanden te leven' – die de kankerpatiënt, samen met zijn dierbaren, in een staat van diepe wanhoop stort. Met weinig of geen hoop en beroofd van hun levenskracht teren ze weg en sterven ze uiteindelijk door cachexie. Dat is een hartverscheurend en pijnlijk proces dat door de conventionele kankerbehandelingen alleen nog maar wordt versneld.

Als de patiënt geen enkele conventionele behandeling (vooral chemo of bestraling) heeft ondergaan dan heeft hij met de GNM een kans op genezing van 95 tot 98 %. Ironisch genoeg werden deze statistieken van dr. Hamers opmerkelijke successen geleverd door de autoriteiten zelf. Toen dr. Hamer in 1997 werd gearresteerd omdat hij drie mensen telefonisch medisch advies zou hebben gegeven zonder medische bevoegdheid, nam de politie al zijn patiëntendossiers in beslag en deze werden geanalyseerd. Vervolgens was een van de publieke aanklagers tijdens het laatste proces gedwongen om toe te geven dat na vijf jaar 6000 van de 6500 patiënten met meestal 'terminale kanker' nog in leven waren. Met conventionele geneeskunde zouden die cijfers omgekeerd zijn geweest. De epidemioloog en bio-statisticus Dr. Ulrich Abel (Duitsland) stelt: 'Het succes van chemotherapie is ontstellend. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat chemo het leven van patiënten die lijden aan de meest voorkomende vormen van organische kanker op een aanvaardbare wijze zou kunnen verlengen. Chemotherapie bij maligniteiten die te ver gevorderd zijn om te kunnen opereren, wat in 80 % van de gevallen van kanker het geval is, is een wetenschappelijk onderontwikkeld gebied.' (*Lancet* 1991)

HET LICHAAM GENEEST ZICHZELF

De oplossing van het conflict luidt het begin in van de tweede fase van het biologische programma. Onze emoties en ons organisme schakelen onmiddellijk over op de genezende stand, geholpen door het vegetatieve zenuwstelsel dat overschakelt op 'vagotonie'. Tijdens de genezingsfase komt de eetlust terug, maar we zijn ook vreselijk moe (misschien zijn we niet eens in staat ons bed uit te komen). Rusten en het lichaam voldoende voedingsstoffen toedienen zijn essentieel gedurende de fase dat het lichaam probeert te genezen. De tweede fase wordt ook wel de 'warme' fase genoemd omdat tijdens de vagotonie de bloedvaten meer open staan, dat veroorzaakt warme handen, warme voeten en een warme huid.

Met de oplossing van het conflict treedt er ook onmiddellijk een verandering op orgaanniveau op. Celvermeerdering (groei van de tumor in door de 'oude hersenen' aangestuurde weefsels) of celvermindering (weefselverlies in door de 'nieuwe hersenen' aangestuurde weefsels) stopt ogenblikkelijk en het bijbehorende herstelproces wordt in gang gezet. Een gebied dat genecrotiseerd of ge-ulcereerd is tijdens de conflictactieve fase wordt nu weer opgevuld en hersteld door nieuwe cellen. Dit gaat meestal gepaard met een mogelijk pijnlijke zwelling omdat een oedeem het weefsel beschermt tijdens het genezen. Andere typische symptomen van het genezen zijn hypersensitiviteit, jeuk, spasmes (als het om spierweefsel gaat) en ontstekingen. Voorbeelden van 'ziekten' die alleen in de genezende fase optreden zijn: bepaalde soorten huidaandoeningen, aambeien, larynchitis, artritis, atherosclerose, blaas- of nier aandoeningen, bepaalde leverziekten en infecties (zie hieronder).

Conventionele geneeskunde interpreteert de natuurlijke celproductie van genezend weefsel als 'maligniteit' want ze zien celvermeerdering (mitose) en ze gaan uit van het standaard onderscheid tussen 'benigne' en 'maligne' tumoren. In de GNM onderscheiden we ook twee type tumoren. Maar de tumoren zijn niet verdeeld in 'goede' en 'slechte', zij worden geclassificeerd naar het type weefsel waaruit ze zijn ontstaan en het deel van de hersenen van waaruit ze worden bestuurd. Zo zijn er tumoren die uitsluitend tijdens de conflictactieve fase ontwikkelen (longtumor, colontumor, levertumor, uterustumor, prostaattumor, etc.) en omgekeerd tumoren die onderdeel uitmaken van het natuurlijke reparatieproces. Net als bij de tumoren die worden aangestuurd vanuit de 'oude hersenen' is de tumorgroei hier ook niet toevallig of zinloos. De celaanwas stopt zodra het weefsel is gerepareerd. Testiscarcinoom, ovariumcarcinoom, lymfklierkanker, non-Hodgkin, verschillende soorten sarcoom, bronchiaalcarcinoom, larynxcarcinoom en cervixcarcinoom zijn allemaal van een genezende aard en komen uitsluitend voor in de genezende fase. Als het genezingsproces niet onderbroken wordt door medicijnen of een recidief van het conflict dan worden deze tumoren uiteindelijk tijdens de slotfase van de genezende fase afgebroken.

Het tweede type borstkanker, het ductaal carcinoom in situ (DCIS) valt ook in deze categorie. Terwijl de melkklierkanker een teken is dat de vrouw in de actieve fase van een zorgconflict is, is de intraductale borstkanker een positief teken dat het bijbehorende scheidingsconflict ('van mijn borst weggerukt') is opgelost. Een vrouw ontwikkelt niet zomaar zonder reden borstkanker. En ze ontwikkelt ook niet toevallig borstkanker in haar rechter of juist in haar linker borst.

HET BELANG VAN ONZE BIOLOGISCHE LATERALITEIT

Dr. Hamer heeft gevonden dat onze lateraliteit bepaalt of een ziekte zoals kanker zich ontwikkelt in de rechter kant of de linkerkant van ons lichaam. De regel is als volgt: een rechtshandig persoon reageert op een conflict met zijn of haar moeder of kind met de linker kant van het lichaam terwijl de rechterkant reageert op een conflict dat te maken heeft met een 'partner', zoals de vader, broer of zus, familielid, vriend, collega etc. Voor linkshandige mensen is dat omgekeerd. Er is altijd een kruising van hersenen naar het lichaam omdat elke hersenhelft (behalve de hersenstam) de tegenover gelegen kant van het lichaam aanstuurt.

De meeste eenvoudige manier om onze biologische lateraliteit vast te stellen is de klap-test. De hand die boven is tijdens het in de handen klappen, is de dominante hand en bepaalt of we links- of rechtshandig zijn. Een borstkanker in de rechter borst, een ovariumcyste in het linker ovarium, een huidaandoening aan de rechter of aan de linker kant (of beide kanten), een verlamming aan de linkerkant (bijvoorbeeld na een hersenbloeding) zijn allemaal een eerste indicatie voor 'wie' er betrokken was bij het oorspronkelijke conflict. Wat betreft de meer complexe conflicten (en hersengebieden) moet ook de hormonale situatie in beschouwing worden genomen om tot een accurate beoordeling te kunnen komen.

DE NUTTIGE ROL VAN DE MICROBEN

Een ander aspect van het onderzoek van dr. Hamer is de rol van de microben tijdens de ontwikkeling van de ziekte. In het kort is dit wat hij gevonden heeft (de vierde Biologische Wet): microben zoals schimmels, bacteriën en virussen zijn alleen actief tijdens de genezingsfase. De wijze waarop zij werken is geheel in overeenstemming met de logica van de evolutie. Zo komen bijvoorbeeld

tuberkelbacillen alleen voor in weefsel dat wordt aangestuurd vanuit de 'oude hersenen'. Hun functie tijdens de reparatiefase is het afbreken van tumoren die nu overbodig zijn, bijvoorbeeld longtumoren, colontumoren, niertumoren, prostaatumoren, uterustumoren, melkklier tumoren, melanomen en mesotheliomen. Tuberkelbacillen zijn noodzakelijk voor het afbreken van de opgebouwde, tijdelijke 'wegwerpcellen' die om een biologische reden zijn aangegroeid tijdens de conflictactieve fase. Als de benodigde bacteriën niet beschikbaar zijn door bijvoorbeeld vaccinatie, gebruik van antibiotica of chemotherapie dan kan de tumor niet voldoende worden afgebroken. Deze blijft bestaan en wordt ingekapseld. Wordt deze echter tijdens een routine onderzoek gevonden dan kan zo'n onschuldige ingekapselde tumor leiden tot een 'kankerdiagnose' en daarmee de oorzaak zijn van een nieuwe conflictshock met nieuwe symptomen. Door de biologische wetten van de ontwikkeling van ziektes te begrijpen, kun je de dit voorkomen.

Terwijl bacteriën de tumorcellen afbreken die niet langer nodig zijn, lijken virussen uitsluitend betrokken te zijn in het genezingsproces van weefsel dat door de hersenschors wordt aangestuurd. Bijvoorbeeld bronchiën, neusslijmvlies, maagslijmvlies, epitheel van de galgangen en de epidermis. Hepatitis, longontsteking, herpes, influenza en maaggreep zijn aanwijzingen dat er een 'virulent', maar natuurlijk genezingsproces aan de gang is. Met betrekking tot de rol van de virussen spreekt dr. Hamer liever van 'hypothetische virussen' omdat het bestaan van virussen recent in twijfel wordt getrokken. Dat zou overeenkomen met dr. Hamers eerdere bevindingen dat het opbouw- en reparatieproces van genecrotiseerd of ge-ulcereerd weefsel ook verloopt zonder dat er virussen aanwezig zijn.

Conventionele geneeskunde bevindt zich in een dilemma omdat ze het patroon van de twee fases van elke ziekte niet herkennen en daardoor meestal de eerste, conflictactieve fase over het hoofd zien. Omdat microben alleen tijdens de genezende fase actief zijn en omdat de activiteit van microben typisch gepaard gaat met zwelling, koorts, pus, afscheiding en pijn, worden de microben gezien als kwaadaardig en als de oorzaak van infectieziektes. Maar microben veroorzaken niet de ziekte, het is immers ons organisme dat de microben aan het werk zet om het genezingsproces te optimaliseren. Microben kunnen natuurlijk worden overgedragen maar ze blijven inactief totdat de persoon in de genezende fase van hetzelfde type conflict komt.

VRAAGTEKENS BIJ METASTASEN

De wijdverbreide theorie van de metastasen, die suggereert dat kankercellen door de bloedbaan of lymfebanen reizen en dan op nieuwe plaatsen kanker veroorzaken, is volgens de GNM en het 'Ontogenetische Systeem van Tumoren' zoals dr. Hamer dat zegt: 'pure academische fictie'. Cellen in het algemeen en kankercellen in het bijzonder kunnen onder geen enkele omstandigheid hun histologische structuur veranderen of de drempel tussen de kiembladen overschrijden. Bijvoorbeeld een cel van een longtumor, die stamt uit het endoderm, die wordt aangestuurd vanuit de hersenstam ('oude hersenen'), en die in de conflictactieve fase *celvermeerdering* geeft, kan zichzelf niet transformeren in een botcel, die stamt uit het mesoderm, die wordt aangestuurd vanuit de grote hersenen ('nieuwe hersenen') en die tijdens de conflictactieve fase van botontkalking weefsel *afbreekt*. In het scenario 'longkanker zaait uit naar de botten' zouden de longkankercellen zelfs een gat creëren (dus celvermindering, het omgekeerde van kanker) ergens in een bot in het lichaam. We moeten ons ook afvragen waarom kankercellen zelden 'uitzaaien' naar het dichtstbijzijnde weefsel, bijvoorbeeld van de uterus naar de cervix. Als kankercellen via de bloedbaan reizen, waarom wordt donorbloed dan niet getest op kankercellen? Waarom worden er dan geen talrijke tumoren gevonden in de wanden van de bloedvaten van kankerpatiënten?

Twee jaar geleden, op 19 augustus 2004 publiceerde de Canadese krant *Globe and Mail* een artikel met de titel 'Onderzoekers op jacht naar bloedtest voor borstkanker' waarin de onthullende uitspraken staan als: 'de jacht op tumorcellen in de bloedbaan duurt al 10 jaar' en 'tot voor kort bestond er geen techniek om op betrouwbare wijze die ene tumorcel te onderscheiden van de miljoenen rode en witte bloedcellen die in een enkele druppel menselijk bloed zitten'. Behalve het feit dat de 'jacht' nog verre van over is (zoals het artikel aangeeft) betekent dit dan niet ook dat de 'metastase hypothese' het publiek al meer dan veertig jaar lang verkeerd heeft geïnformeerd en daarbij miljoenen kankerpatiënten doodsbang heeft gemaakt?

Natuurlijk betwist dr. Hamer niet het feit van secundaire kanker maar deze volgende tumoren worden niet veroorzaakt door reizende kankercellen die op miraculeuze wijze in een ander celtype veranderen maar door nieuwe conflictshocks. Een nieuw DHS kan optreden door bijkomende traumatische levenservaringen of door de schok van de diagnose. Zoals we al eerder noemden, kan een onverwachte kankerdiagnose, of de mededeling dat het is 'uitgezaaid', een doodsangst veroorzaken (die longkanker tot gevolg heeft) of elk ander type shock die is verbonden met de diagnose en zo nieuwe kanker in andere delen van het lichaam veroorzaken. In veel gevallen halen deze patiënten de genezingsfase niet meer omdat de zware stresstoestand hen dusdanig verzwakt dat ze weinig kans maken om de zeer giftige chemo-'therapie' te overleven.

Na longkanker is de tweede meest voorkomende secundaire kanker botkanker. Dr. Hamer ontdekte dat onze botten biologisch verbonden zijn met onze eigenwaarde en ons zelfrespect. Als jou wordt verteld dat je een 'levensbedreigende ziekte' hebt, vooral als die verondersteld wordt zich als een 'lopend vuur' door het hele lichaam te verspreiden, dan staat dat gelijk met: 'nu ben ik waardeloos'. De botten die dicht bij de plek liggen waar we ons waardeloos voelen, beginnen te ontkalken. (Bij borstkanker is dat vaak in het gebied van het borstbeen of de ribben). Net als bij een gebroken bot wordt het doel van dit biologische programma (van de ziekte) pas merkbaar aan het eind van de genezingsfase. Als de reparatiefase is voltooid dan zal het bot veel sterker zijn dan voorheen en zo zijn we een eventuele volgende keer beter bestand tegen een nieuw 'eigenwaarde conflict'.

DE AARD VAN HERSENTUMOREN

Wanneer het conflict is opgelost dan zal de laesie in de hersenen – tegelijk met de psyche en het orgaan – ook beginnen aan de genezingsfase. Net als bij elke wond die geneest, ontwikkelt zich een oedeem (vochtophoping) om bescherming te bieden aan het herstellende zenuwweefsel. Op de hersenscan kun je de veranderingen goed zien: de scherpe ringen verdwijnen in het oedeem en het ziet er nu onduidelijk, onscherp en donker uit.

Op het hoogtepunt van de genezende fase, als het hersenoedeem zijn maximale omvang heeft bereikt, zenden de hersenen een korte heftige impuls uit om het oedeem af te voeren. In de GNM terminologie heet deze terugkoppeling de 'epileptoïde crisis' (EC) Tijdens deze crisis wordt het hele organisme kort in de sympaticotone toestand teruggeworpen. Je beleeft weer even de typische kenmerken van de conflictactieve fase zoals koud zweet, koude extremiteiten, snelle hartslag en misselijkheid. De duur en de intensiteit van deze voorgeprogrammeerde crisis is afhankelijk van de duur en intensiteit van het conflict wat eraan vooraf is gegaan. Enkele voorbeelden van dit cruciale keerpunt zijn hartaanvallen, hersenbloedingen, astma aanvallen en epileptische aanvallen. Het type crisis hangt af van de aard van het conflict en het specifieke hersengebied dat daarbij betrokken is.

Als het oedeem is uitgescheiden dan verzamelen zich neuroglia-cellen op die plek om de functie van de zenuwcellen die bij de shock betrokken waren, te herstellen. Neuro-glia-cellen zijn hersenbindweefselcellen die structurele ondersteuning bieden aan neuronen. Deze natuurlijke glia ophoping noemt de conventionele geneeskunde een 'hersentumor' - met vaak ijzingswekkende gevolgen voor de patiënt. Al in 1981 stelde dr. Hamer vast dat een 'hersentumor' geen ziekte is maar een symptoom van de genezende fase - dat parallel verloopt in het orgaan dat door het corresponderende hersengebied wordt aangestuurd en dat tegelijkertijd door de genezende fase gaat. 'Gemetastaseerde hersentumoren' bestaan dus ook niet.

DE GNM THERAPIE (in een notendop)

De allereerste stap in de GNM therapie is de patiënt de biologische betekenis van een symptoom, bijvoorbeeld kanker, leren begrijpen in relatie met de psychische oorzaak. Een hersenscan en een grondige medische voorgeschiedenis zijn noodzakelijk om te bepalen of een patiënt nog conflictactief is of al in de genezingsfase. Als de patiënt nog conflictactief is dan ligt de focus op het vinden van het oorspronkelijke DHS en op het vinden van een strategie om het conflict op te lossen. Het is cruciaal om de patiënt voor te bereiden op de symptomen van de genezing en op eventuele complicaties. Deze symptomen zijn heel voorspelbaar! Voor het eerst in de geschiedenis van de geneeskunde geven de ontdekkingen van dr. Hamer ons een betrouwbaar systeem dat ons in staat stelt om de ontwikkeling en de symptomen van elke ziekte te begrijpen en te voorspellen. Dit is *echte* preventieve

geneeskunde en dit aspect van de GNM kan niet genoeg benadrukt worden. Werkelijke preventie vereist het begrijpen van de echte oorzaak van een ziekte, en het onderzoekswerk van dr. Hamer verschaft ons dat in imposante details. Door de 'Vijf Biologische Wetten' van de oorzaak en het genezingsproces van ziektes te begrijpen, kunnen we onszelf bevrijden van de angst en de paniek die vaak samengaan met het hebben van symptomen. Deze kennis is meer dan macht, het kan levens redden.

Over de Auteur



Caroline Markolin, Ph.D., is een full-time docent in de German New Medicine ®. Ze is onderricht door dr. Hamer en hij heeft haar zijn goedkeuring gegeven om les te geven. Ze woont in Canada en biedt regelmatig GNM weekend seminars aan in Montreal en Vancouver.

Voor meer informatie over GNM bezoek de website: www.LearningGNM.com

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in: EXPLORE! Vol. 16/nr.2 - 2007